


โรคพยาธิลำไส้แคปิลลาเรีย

พยาธิลำไส้แคปิลลาเรีย (*Capillaria philippinensis*)

เป็นหนอนพยาธิตัวกลมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในลำไส้เล็ก ๆ ทำให้ท้องร่วงรุนแรงและเรื้อรัง เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอย่างทันท่วงที พบมากในภาคกลางและภาคอีสานของประเทศไทย




พยาธิตัวแก่



พยาธิตัวอ่อน

โรคนี้ติดต่อได้อย่างไร

ติดต่อจากการรับประทานอาหารพวกปลาน้ำจืดที่ปรุงไม่สุก เช่น ปลาไน ปลาตะเพียน ปลาช่อน โดยทำก๋วยเตี๋ยวปลา ทำให้ได้รับตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อที่อยู่ในปลา เมื่อพยาธิระยะติดต่อเข้าสู่คนจะฝังตัวอยู่ในลำไส้เล็กของคน เจริญเป็นพยาธิตัวเต็มวัย และออกไข่ปะปนกับอุจจาระ ถ้าไข่ปนเปื้อนลงแหล่งน้ำทำให้ปลาในแหล่งน้ำกินไข่พยาธิเข้าไป และไข่ฟักเป็นตัวอ่อนในปลา พร้อมจะติดต่อสู่คนต่อไป



วงจรชีวิตพยาธิลำไส้แคปิลลาเรีย

ทราบได้อย่างไรว่าติดโรคพยาธินี้

ตรวจอุจจาระ จะพบได้ทั้งพยาธิตัวเต็มวัย ตัวอ่อนและระยะไข่ ร่วมกับการสังเกตอาการ



ไขพยาธิในอุจจาระ

อาการของโรค

พยาธิตัวเมียในลำไส้ของคนจะออกไข่ ไข่จำนวนมากจะฟักเป็นตัวอ่อน และเจริญเป็นพยาธิตัวแก่ พยาธิตัวแก่ฝังตัวที่ผนังลำไส้เล็ก ทำให้สูญเสียหน้าที่ในการดูดซึมอาหาร เกิดอาการท้องเสีย อุจจาระมีกากอาหารที่ไม่ย่อย ท้องคลื่น โครกคราก ปวดท้อง บางรายถ่ายเหลวเรื้อรังนานนับเดือน ถ่ายวันละ 5-10 ครั้ง ท้องโตกดเจ็บ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ทำให้เกิดภาวะขาดสารอาหาร ผู้ป่วยจะผอมแห้ง ไม่มีแรง ภูมิคุ้มกันโรคลดลง และอาจรุนแรงถึงตายได้



อาการผู้ป่วยผอมแห้ง

จะป้องกันโรคนี้ได้อย่างไร

กินปลาน้ำจืดที่ปรุงสุกแล้ว และถ่ายอุจจาระลงส้วมให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันการกระจายของไข่พยาธิ